

用藥指導單張

衛教小組 DE12280101

學名：Empagliflozin+Metformin

商品名：jarDIANCE（複方）DUO 12.5/850MG

中文名：恩美糖膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

適用於單用metformin或empagliflozin時血糖控制不佳，或早已同時接受metformin及empagliflozin合併治療而狀況穩定者的第二型糖尿病成人病人，在飲食與運動外，做為改善血糖之輔助治療。

Empagliflozin用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病的成人病人時，可降低心血管原因死亡的風險。然而，本品恩美糖用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病的成人病人時，其降低心血管原因死亡的風險的有效性尚未被建立。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

- 針對體液容量減少且先前未接受empagliflozin治療的病人，建議在開始服用恩美糖前先矯正此一狀況。
- 請根據病人治療現況調整恩美糖的初始劑量：
 - 對於正在接受metformin治療的病人，請換成內含empagliflozin 5mg及與近似之metformin每日總劑量的恩美糖；
 - 對於正在接受empagliflozin治療的病人，請換成內含metformin 500 mg及近似之empagliflozin每日總劑量的恩美糖；
 - 對於已同時接受empagliflozin和metformin治療的病人，請換成各成分所含每日總劑量皆與原來相同的恩美糖。
- 請一天兩次隨餐服用恩美糖；劑量調升應逐步以減少metformin引起的腸胃副作用。
- 應根據有效性及耐受性調整劑量，但不可超過最高建議每日劑量（metformin為2000 mg，empagliflozin為25 mg）。

三、使用時我該注意的特別事項？

恩美糖禁用於重度腎功能不全病人（腎絲球過濾率估計值小於30 mL/min/1.73 m²）。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DE12280101

學名：Empagliflozin+Metformin

商品名：jarDIANCE（複方）DUO 12.5/850MG

中文名：恩美糖膜衣錠



低血壓、急性腎臟損傷及腎功能不全。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於 30° C 以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師