

用藥指導單張

衛教小組 DM15370101

學名：Medium-chain triglycerides, Soya-bean oil

商品名：smoflipid ★20% 100ml (小包裝)

中文名：斯莫脂肪 靜脈輸注液(需給藥)



一、此藥品的用途是什麼？

當病人口服或經腸營養不可能、不足或禁忌時，作為非經腸營養方式的一部分。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

應依據病人排除輸注脂肪的能力來決定劑量和輸注速率，請參閱。

成年人

標準劑量是 1.0~2.0 公克脂肪 / 公斤體重 / 天(相當於 5~10 毫升 / 公斤體重 / 天)。

建議輸注速率是 0.125 公克脂肪 / 公斤體重 / 小時(相當於 0.63 毫升 SMOFlipid / 公斤體重 / 小時)，但不得超過 0.15 公克脂肪 / 公斤體重 / 小時(相當於 0.75 毫升 SMOFlipid / 公斤體重 / 小時)。

新生兒與嬰兒

初始劑量應為 0.5~1.0 公克脂肪 / 公斤體重 / 天，之後以 0.5~1.0 公克脂肪 / 公斤體重 / 天漸增至最高劑量 3.0 公克脂肪 / 公斤體重 / 天。

建議每日劑量不超過 3.0 公克脂肪 / 公斤體重 / 天(相當於 15 毫升 SMOFlipid / 公斤體重 / 天)。

輸注速率不得超過 0.125 公克脂肪 / 公斤體重 / 小時。

孩童

建議每日劑量不超過 2.0 公克脂肪 / 公斤體重 / 天(相當於 10 毫升 SMOFlipid / 公斤體重 / 天)。

給藥第一週應漸增每日劑量。

輸注速率不得超過 0.15 公克脂肪 / 公斤體重 / 小時。

使用方法周邊或中心靜脈輸注。當用於新生兒和 2 歲以下兒童時，溶液和輸液袋應避光直至給藥完成。

三、使用時我該注意的特別事項？

病人若出現任何過敏反應之徵兆或症狀(例如：發燒、顫抖、紅疹或呼吸困難)，必須立即停止輸注。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM15370101

學名：Medium-chain triglycerides, Soya-bean oil

商品名：smoflipid ★20% 100ml (小包裝)

中文名：斯莫脂肪 靜脈輸注液(需給藥)



四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

體溫略為升高。

六、此藥儲存時的條件為何？

保存溫度不得超過 25° C。不可冷凍。超過標籤上所標示的有效期限後，請勿使用本品。避免孩童觸碰。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師