

用藥指導單張

衛教小組 DQ10810101

學名：Capecitabine

商品名：CALVEDA FILM-COATED TABLET ★ 500MG

中文名：艾結達膜衣錠

一、此藥品的用途是什麼？

乳癌：

Capecitabine與docetaxel併用於治療對anthracycline化學治療無效之局部晚期或轉移性乳癌病患。Capecitabine亦可單獨用於對紫杉醇(taxane)及anthracycline化學治療無效，或無法使用anthracycline治療之局部晚期或轉移性乳癌病患。

結腸癌或大腸(結腸直腸)癌：

Capecitabine可作為第三期結腸癌患者手術後的輔助性療法。

Capecitabine可治療轉移性大腸(結腸直腸)癌病患。

胃癌：

Capecitabine合併platinum可使用於晚期胃癌之第一線治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Capecitabine錠劑應於飯後30分鐘內與水一起吞服。如果出現病情惡化的現象或無法耐受的毒性反應，即應停止治療。

建議劑量：

單一治療

結腸癌、結腸直腸癌與乳癌

單獨使用Capecitabine做為結腸癌的輔助治療用藥，或做為轉移性結腸直腸癌、或局部晚期或轉移性乳癌的治療用藥時，建議起始劑量為連續14天每天投予兩次1250毫克/平方公尺(早晚各一次，相當於每日總劑量2500毫克/平方公尺)，然後停藥7天。對第III期大腸癌患者，建議進行為期6個月的輔助治療。

合併治療

結腸癌、結腸直腸癌及胃癌

合併治療時(除併用irinotecan外)，Capecitabine的建議起始劑量應降低為800至1000毫克/平方公尺，每天兩次，連續14天，之後休息7天；或625毫克/平方公尺，每天兩次，連續給予。當與irinotecan (XELIRI)合併治療時，Capecitabine的建議起始劑量為800毫克/平方公尺，每天兩次，連續14天，之後休息7天，每3週為一療程，並於每個療程第1天給予irinotecan 200毫克/平方公尺。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ10810101

學名：Capecitabine

商品名：CALVEDA FILM-COATED TABLET ★ 500MG

中文名：艾結達膜衣錠

將生物製劑加入併用療程中時，不影響Capecitabine的起始劑量。對接受Capecitabine加cisplatin合併治療的患者，依照cisplatin產品說明書的指示，應於投予cisplatin之前即開始給予前置藥物，以維持適當的水份及防止嘔吐。對接受Capecitabine加oxaliplatin合併治療的患者，建議應依照oxaliplatin產品說明書給予止吐劑之前置藥物。針對第三期結腸癌病患的輔助治療，建議持續6個月。

乳癌

與docetaxel併用於治療轉移性乳癌時，Capecitabine的建議起始劑量為連續14天每天投予兩次1250毫克/平方公尺，然後停藥7天，並每3週一次以1小時的時間靜脈輸注75毫克/平方公尺的docetaxel。對接受Capecitabine加docetaxel合併治療的患者，依照docetaxel產品說明書的指示，應於投予docetaxel之前即開始以口服皮質類固醇(如dexamethasone)進行前置治療。

三、使用時我該注意的特別事項？

Capecitabine會對駕駛及機械操作的能力產生輕或中度的影響。
Capecitabine可能會引發暈眩、疲倦及噁心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常見的副作用是胃腸不適、手足症候群(掌足紅腫疼痛)、疲倦、無力、厭食。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於30° C以下的環境。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師