

用藥指導單張

衛教小組 DM9710101

學名：Metronidazole

商品名：metroZOLE（口服）250MG

中文名：妳樂淨內服錠劑



一、此藥品的用途是什麼？

治療陰道滴蟲感染所引起之陰道炎、白帶、阿米巴痢疾、阿米巴肝膿腫及對Metronidazole具有感受性之厭氧菌所引起之嚴重感染。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一般成人劑量：

抗菌劑(系統性)——

厭氧菌感染：口服，每公斤體重7.5mg，一次最高達1g，每六小時一次，為時7天。

幽門螺旋桿菌相關之十二指腸潰瘍(治療輔助)：口服，500mg，一天三次，與Bismuth Subsalicylate及其它口服抗生素如Ampicillin或Amoxicillin併服，為時一至二週。

抗原蟲劑——

阿米巴病：口服，500-700mg，一天三次，為時5-7天。

滴蟲病：口服，2g，以單劑量投與，或1g，一天二次，為時一天；或250mg，一天三次，為時7天。

驅蟲劑(系統性)——

龍絲蟲病(Dracunculiasis)：口服，250mg，一天三次，為時10天。

一般成人處方限量：抗菌(系統性)：每天最高不可超過4g。一般孩童劑量：

抗菌劑(系統性)：

厭氧菌感染：口服，每公斤體重7.5mg，每六小時一次，或每公斤體重10mg，每8小時1次。

抗原蟲劑：

阿米巴病：口服，每公斤體重11.6-16.7mg，一天三次，為時10天。

滴蟲病：口服，每公斤體重5mg，一天三次，為時7天。

驅蟲劑(系統性)：

龍絲蟲病(Dracunculiasis)：口服，每公斤體重8.3mg，一次最高達250mg，一天三次，為時10天。

三、使用時我該注意的特別事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM9710101

學名：Metronidazole

商品名：metroZOLE（口服）250MG

中文名：妳樂淨內服錠劑



下列患者授與時請特別注意：

1. 有嚴重肝病之患者。
2. 較易患水腫病者或服用副腎皮質類固醇之患者。
3. 有血液惡病質病歷之患者，治療前後應注意測量其白血球數量。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈、不愉快的金屬味、頻尿、皮膚紅疹。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於25° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師