

用藥指導單張

衛教小組 DQ0620101

學名：Cyclophosphamide

商品名：ENDOXAN★ 50MG (口服)

中文名：癌德星糖衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

Hodgkin病・非Hodgkin淋巴瘤(Non-Hodgkin's lymphomas)濾泡淋巴瘤(Follicular lymphomas)網狀細胞肉瘤(reticulum cell sarcoma)淋巴母細胞的淋巴肉瘤, Burkitt's淋巴瘤(首選用藥)・多發性骨髓瘤白血病(Leukemias)・慢性淋巴性白血病(Chronic lymphocytic leukemia)慢性顆粒性白血病(Chronic leukemia)急性骨髓性和單核細胞白血病(Acute myelogenous and monocytic leukemia)・急性淋巴母細胞白血病(acute lymphoblastic leukemia)蕈狀肉芽腫(Mycosis fungoides)神經母細胞瘤(Neuroblastoma)卵巢腺癌(Adenocarcinoma of Ovary)網膜母細胞瘤(Retinoblastoma)(首選用藥)・乳或肺癌(首選用藥)。

防治癌症

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

口服：成人—1天1~5mg/kg；孩童—成人：2~8mg/kg或60~250mg/m²，共6天或6天以上。維持量：2~5mg/kg，或50~150mg/m²每週2次。

三、使用時我該注意的特別事項？

有下列情況之病人應用Endoxan時應注意：

1. 白血球、血小板減少症。
2. 骨髓之腫瘤細胞浸潤。
3. 以前用X光治療過。
4. 以前用其他的Cytotoxic agent治療過。
5. 肝功能損害。

因為Endoxan有抑制免疫機轉之作用，病人如引起細菌、黴菌或病毒之感染應停藥或更改劑量，尤其是與類固醇藥物合併治療，有時會使病人死亡。在這些情況下，水痘-帶狀疱疹之感染尤其危險。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

本單張資料僅供參考・如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ0620101

學 名：Cyclophosphamide

商品名：ENDOXAN★ 50MG (口服)

中文名：癌德星糖衣錠



D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

接受Endoxan治療的病人，副作用的產生依劑量而定，在大多數的案例中市可逆的。最常見的副作用是噁心、嘔吐。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師