用藥指導單張

衛教小組 DJ14360101

學　名：D.P.T., Polio, Hemophilus influenzae B

商品名：PENTAXIM (五合一疫苗) (公費)

中文名：潘多星五合一疫苗(公費)



一、此藥品的用途是什麼？

可使出生後二個月至七歲的孩童對白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺症及侵襲性b型流行性感冒嗜血桿菌感染症產生免疫力。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

PEDIACEL：1. 連續3針(每針0.5ml)，肌注，2個月大時，開始注射，每隔4～8週追加。第4劑在1年以後。

2. 第2次預防注射：在4～6歲時。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常見的反應包括注射部位發生紅腫、疼痛、煩躁不安及輕微發燒。這些症狀可能在注射後24小時內發生，而且可能持續24-48小時。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 2 ~ 8 度冰箱內(勿冷凍)；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11