用藥指導單張

衛教小組 DB5680301

學　名：Ipratropium 0.2mg,Salbutamol 1mg/ml

商品名：combivENT UDV（吸入液）2.5ML

中文名：冠喘衛單一劑量吸入液



一、此藥品的用途是什麼？

用於治療阻塞性呼吸道疾病併發的可逆性支氣管痙攣需要一種以上支氣管擴張劑治療者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
下列建議劑量適用於成人(包含老年人)及12歲以上的青少年： 治療急性發作 ：對大多數病人，一瓶單一劑量吸入液即可迅速緩解症狀。 情況嚴重的病人，若一瓶單一劑量吸入液無效，可能需要使用兩瓶單一劑量吸入液，但在這些情況，病患需立刻請教醫師或就近的醫院。 持續性治療 ：每次一瓶單一劑量，每日三至四次。需要時劑量可增加，但每一天不可超過12個定量。

三、使用時我該注意的特別事項？

Ipratropium:

1. 氣喘急性發作，不宜使用本品急救。
2. 本品適於長期治療用，特別是與其他支氣管擴張劑併用，療效尤佳。
3. 每次噴霧間隔30~60秒，才能達到最佳效果，每次吸入間隔為3分鐘。

Salbutamol:

1. 不要超過推薦劑量，過量使用會造成嚴重的併發症，如急性氣喘危象或心跳停止。
2. 下列病患使用本品宜小心：心臟血管疾病，甲狀腺亢進和糖尿病，此外還有懷孕或授乳的母親服用本品也要謹慎為之。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

Ipratropium: 咳嗽，頭痛，頭重感震顫，腹部不適，心悸，視力模糊，苦味，嘶啞，尿滯留。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03

用藥指導單張

衛教小組 DB5680301

學　名：Ipratropium 0.2mg,Salbutamol 1mg/ml

商品名：combivENT UDV（吸入液）2.5ML

中文名：冠喘衛單一劑量吸入液



Salbutamol: 心悸，心跳過快，血壓增加，震顫，神經質，眩暈，失眠，頭痛，心絞痛，非尋常的味覺，口咽乾燥。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03