用藥指導單張

衛教小組 DR9460301

學　名：Ketamine

商品名：keTAlaR ★ 500MG/10ML,1ML(管藥三)

中文名：克太拉注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

全身麻醉。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
誘導劑量—1～4.5mg/kg，在60秒內IV注射或6.5～13mg/kgIM注射。維持劑量—如果須要的話，可增至全誘導劑量的1.5倍，隨病人的需要做適當的調整。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 酒精中毒、高血壓、腦脊髓液壓昇高等的病人，以及孕婦在使用本品宜小心
2. 本品要緩慢IV注射投與(須超過1分鐘)，避免造成過度的呼吸抑制和高血壓，不要IV注射濃度為100mg/ml，也不可以沒有滅菌的水、生理食鹽或葡萄糖溶液稀釋者。
3. 不要將ketamine與使用過barbiturates的注射器混合，因為會造成化學性的配合禁忌。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

血壓上昇，心跳過快，呼吸刺激。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.14