

用藥指導單張

衛教小組 DQ0380101

學名：Bicalutamide

商品名：CASODEX ★ 50MG

中文名：可蘇多錠



一、此藥品的用途是什麼？

與LHRH類似劑療法或手術去勢療法併用於進展性攝護腺癌。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成年男子，包括老人：一天一錠(50公絲)。本品應與LHRH類似劑或手術去勢療法同時開始使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本品廣泛的由肝臟代謝。資料顯示，嚴重肝功能損傷的病人對於本品的排除可能較慢，這會導致少量的本品在身體內累積。因此，對於中度或重度肝功能失調的病人服用本品時應謹慎。
2. 本品禁用於女性，而且絕不可用於孕婦或授乳婦。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

常見副作用包括熱潮紅、搔癢(pruritus), 此外乳房觸痛和男性女乳症的現象會因伴隨的去勢療法而降低、本品亦可能造成腹瀉、噁心、嘔吐、衰弱和皮膚乾燥。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師