用藥指導單張

衛教小組 DB3930201

學　名：Pseudoephedrine

商品名：seuDORIN 30MG

中文名：秀得寧錠



一、此藥品的用途是什麼？

鼻腔、支氣管充血之緩解。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人通常劑量為每天2～4次，每次1～2錠。

小孩用量，4個月以下嬰孩，每天4次，每次半錠（15mg），4個月以上到6歲小孩，每天4次，每次一錠。

三、使用時我該注意的特別事項？

高血壓患者忌用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

可能會引起心悸、胸痛、喘鳴、呼吸急促、痙攣、不安、幻覺等。

六、此藥儲存時的條件為何？

本藥應儲存於緊密容器內、陰涼（15～30℃）乾燥避光處所。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03