用藥指導單張

衛教小組 DA7180201

學　名：Diltiazem

商品名：HERBESSER（注射）50MG

中文名：合必爽注射液



一、此藥品的用途是什麼？

陣發性上室性心搏過速，對於心房撲動、心房纖維顫動情況時，快速心室心搏之暫時性控制，緊急性高血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
使用時將本劑(Diltiazem HCl 10mg或50mg)溶解於5ml或以上的生理食鹽水或葡萄糖注射液，如下述用法投予:

1.陣發性上室性心搏過速，對於心房撲動、心房纖維顫動情況時，快速心室心搏之暫時性控制。通常成人1次Diltiazem HCl 10mg徐緩靜脈注射約3分鐘。依年齡、症狀適宜增減用量。

2.緊急性高血壓:通常成人每分鐘投與5-15μg/kg b.w.之輸注量，需利用靜脈點滴給藥，當血壓降至目標值之後，需監測血壓值，來調整輸注速率。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.須持續的監視心電圖及血壓。

2.當需要使用本藥在可能會發生完房室阻。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

主要的副作用包括:脈搏徐緩(1.1%)、血壓過低(0.7%)、第一度房室阻斷(0.4%)、第二度房室阻斷(0.3%)、房室接合心律(0.3%)等。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所，避光儲存；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20