# 用藥指導單張

衛教小組 DA10170101

學　名：Pitavastatin

商品名：ZULITOR 4MG

中文名：平脂膜衣錠




## 一、此藥品的用途是什麼？

原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人每日一次口服Pitavastatin 1~2mg。劑量可依年齡、症狀作適當增減，低密度膽固醇值(LDL-C)降幅不足時可調升劑量，每日最高服用劑量為4mg。

在Pitavastatin療程開始後或逐步調整劑量時，應於4週後檢測血脂濃度並據以調整劑量。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：　不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

## 五、此藥會造成什麼副作用？

最常出現的不良反應為肌肉疼痛、背痛、腹瀉、便秘及四肢疼痛。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於25℃以下、小孩不易取得之乾燥處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02