

用藥指導單張

衛教小組 DQ15100101

學名：Cabozantinib

商品名：CABOMETYX ★ F.C. 60MG (健保事審)

中文名：癌必定膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

肝細胞癌：適用於曾接受sorafenib治療之肝細胞癌病人。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

安排進行外科手術(包括牙科手術)前至少28天應停用本品。

- 請勿以 cabozantinib膠囊取代 CABOMETYX 錠劑。
- CABOMETYX 不可和食物同時服用。給藥時間應於進食前至少1小時或進食後至少2小時。
- CABOMETYX 錠劑應整粒吞服。不可將CABOMETYX錠劑粉碎。

肝細胞癌之建議劑量 CABOMETYX建議劑量為60 mg每日一次，不得與食物併服，應給藥至疾病惡化或出現無法接受之毒性為止。

針對成人及體表面積大於或等於1.2 m²的12歲以上孩童病人，CABOMETYX作為單一療法的建議劑量為60 mg每日一次，依據建議給藥直到疾病惡化或出現無法接受之毒性為止。針對體表面積小於1.2 m²的12以上孩童病人，CABOMETYX作為單一療法的建議劑量為40 mg每日一次，依據建議給藥直到疾病惡化或出現無法接受之毒性為止。

三、使用時我該注意的特別事項？

治療期間不可食葡萄柚(汁)或營養補充劑。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

出血、腸胃穿孔、血栓事件、高血壓或高血壓危象、腹瀉、肢端紅腫症候群。

六、此藥儲存時的條件為何？

25°C以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師