
用藥指導單張

衛教小組

學　名：Mycophenolate mofetil

商品名：CELLCEPT 250MG

中文名：山喜多膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

與cyclosporin和類固醇合併使用，以預防或緩解腎臟移植之急性器官排斥、預防心臟和肝臟移植之急性器官排斥。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

預防腎臟排斥的標準劑量

建議給予腎臟移植病人的口服或靜脈注射(注射2個小時以上)劑量為每天二次每次1克(每日劑量2克)。

預防心臟排斥的標準劑量

建議給予心臟移植病人的口服劑量為每天二次每次1.5克(每日劑量3克)。

預防肝臟排斥的標準劑量

建議給予肝臟移植病人的劑量為每天口服二次每次1.5克(每日劑量3克)。

治療第一次或頑固的腎臟排斥的標準劑量

建議給予治療第一次或頑固的排斥現象的口服劑量為每天二次每次1.5克(每日劑量3克)。

口服給藥

在腎臟、心臟和肝臟移植後應儘速給予CellCept®的起始劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用，切勿擅自增減藥量或停藥，並請按時回診

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

便秘、腹瀉、頭痛、噁心、無力等。

六、此藥儲存時的條件為何？

請諮詢醫師或藥師

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20