用藥指導單張

衛教小組 DM9760101

學　名：Fursultiamine(vit B1)+Riboflavin (vit B2)

商品名：ALINAMIN-F50 S.C. TAB

中文名：合利他命F50糖衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

神經炎、維生素Ｂ１缺乏諸症、神經痛、術後腸管麻痺、眼睛疲勞、神經性膀胱炎。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人一日1-3錠，分1-3次於飯後勿咬碎服用，立即吞服即可,可依年齡症狀增減。但施行大量療法時，原則上1日量服用100mg以上，對重症神經性疾患則1日量增加到300mg較為適宜。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

服用本藥後尿液呈黃色，此係本劑所含之維生素B2所引起,不必掛慮。

六、此藥儲存時的條件為何？

請保存於乾燥、陰涼及避免日光直射的場所，以確保品質。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03