
用藥指導單張

衛教小組 DQ12790101

學　名：Irinotecan Liposome

商品名：ONIVYDE ★ 43MG/10ML(健保事審)

中文名：安能得微脂體注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

ONIVYDE(irinotecan微脂體注射劑)適用於轉移性胰腺癌，合併5-fluorouracil和leucovorin治療曾接受過gemcitabine的患者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

•ONIVYDE的建議劑量為70mg/m2 (以irinotean free base計算)靜脈輸注90分鐘，每2週注射一次。

•在轉移性胰腺癌的臨床試驗中，ONIVYDE輸注完成後，接續leucovorin 400mg/m2靜脈輸注30分鐘，隨後為5-fluorouracil 2,400 mg/m2靜脈輸注46小時。每2週給藥一次。

• 已知為UGT1A1*28對偶基因同型合子的患者，ONIVYDE的建議起始劑量為50mg/m2(以irinotean free base計算)，靜脈輸注90分鐘。若能夠耐受，則於後續週期可將ONIVYDE的劑量調高到70mg/m2(以irinotean free base計算)。

• ONIVYDE對於血清膽紅素超出正常值上限的患者並沒有建議劑量。

• ONIVYDE於重度腎功能不全(CLcr<30 mL/min)及洗腎患者的資料不足。因此，不建議使用於重度腎功能不全及洗腎患者。

• 前置藥物

於輸注ONIVYDE前30分鐘注射一劑皮質類固醇和一劑止吐劑。

三、使用時我該注意的特別事項？

製備

1.從藥瓶中抽出已算好體積的ONIVYDE。以500mL 5%葡萄糖注射液或0.9%氯化鈉注射液稀釋ONIVYDE，並以輕輕翻轉的方式混合稀釋溶液。

2.稀釋後的溶液應避光。

3.製備後之稀釋溶液可於室溫下儲存4小時內使用，或在冷藏狀態下2℃至8℃儲存24小時內使用。注射前讓稀釋溶液恢復到室溫後使用。

4.請勿冷凍。

投予

靜脈輸注稀釋溶液90分鐘。請勿使用管線過濾器。未使用完的溶液應丟棄。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11


用藥指導單張

衛教小組 DQ12790101

學　名：Irinotecan Liposome

商品名：ONIVYDE ★ 43MG/10ML(健保事審)

中文名：安能得微脂體注射劑



四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

最常見的不良反應(≥20%)為腹瀉、疲倦/無力、嘔吐、噁心、食慾降低、口腔炎與發燒。

六、此藥儲存時的條件為何？

請將ONIVYDE儲存於2℃至8℃。

請勿冷凍。請避光。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11