# 用藥指導單張

衛教小組 DF0580101

學　名：Etoricoxib

商品名：ARCOXIA 60MG

中文名：萬克適錠




## 一、此藥品的用途是什麼？

骨關節炎(OA)與類風濕性關節炎(RA)之表徵與症狀的急慢性治療、治療急性痛風性關節炎、治療原發性經痛、治療僵直性脊椎炎。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

ARCOXIA 可與食物併服，亦可不與食物併服。

骨關節炎：建議劑量為每日一次 60mg。

類風濕性關節炎：建議劑量為每日一次 90mg。

僵直性脊椎炎：建議劑量為每日一次 90mg。

急性痛風性關節炎：建議劑量為每日一次 120mg。

ARCOXIA 120mg應僅用於急性症狀期，治療時間不可超過八天。

原發性經痛：建議劑量為每日一次 120mg。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

1. 對有缺血性心臟病病史的患者應多加小心。
2. 雖然與ARCOXIA 治療並無絕對關聯性，但目前已知：先前曾有胃腸道穿孔、潰瘍及出血(PUB)之病史以及65歲以上的患者發生PUB 的危險性較高。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

## 五、此藥會造成什麼副作用？

發生率 > 1%且高於安慰劑者包括：虛弱無力/疲倦、眩暈、下肢水腫、高血壓、消化不良、胃灼熱、噁心、頭痛、ALT升高、AST升高。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

請諮詢醫師或藥師

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09