
用藥指導單張

衛教小組 DB9690101

學　名：Aminophylline

商品名：ASIPHYLLINE INJ. 250MG

中文名：心安寧注射液



一、此藥品的用途是什麼？

心因性、支氣管氣喘及支氣管痙攣。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一般成人劑量：支氣管擴張劑－靜脈注射，250~500mg，每六小時一次。急性發作－

負載劑量：靜脈輸注，每公斤體重6mg，輸注時間須在20分鐘以上。

維持劑量：年老或有肺性心臟病之病患:靜脈輸注，每小時、每公斤體重600mcg(0.6mg)，為時12小時，然後，每公斤體重300mcg(0.3mg)，每小時一次。

一般兒童劑量：支氣管擴張劑－靜脈注射，每公斤體重5mg或每平方公尺體表面積150mg，每六小時一次。

急性發作－

負載劑量-6個月以下嬰兒：由醫師依個體決定。 6個月以上16歲以下兒童：靜脈輸注，每公斤體重6mg，輸注時間須在20分鐘以上。

維持劑量-6個月以下嬰兒：由醫師依個體決定。 6個月以上9歲以下兒童：靜脈輸注，每小時、每公斤體重1.2mg，為時12小時；然後每公斤體重1mg，每小時一次。9歲至16歲兒童：靜脈輸注，每小時、每公斤體重1mg，為時12小時，然後每公斤體重800mcg(0.8mg)每小時一次。

三、使用時我該注意的特別事項？

Theophylline會排泄於乳汁中，故哺乳之婦女使用本藥時對嬰兒會引起刺激性其他副作用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、噁心、嘔吐、失眠、食慾不振。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.10


用藥指導單張

衛教小組 DB9690101

學　名：Aminophylline

商品名：ASIPHYLLINE INJ. 250MG

中文名：心安寧注射液



本品應儲於陰涼(15~30℃)避光處所並避免冷凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.10