用藥指導單張

衛教小組 DM10460101

學　名：Multivitamins

商品名：LYO-POVIGENT INJ.

中文名：利保維源注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

不能或不能充分經口、經腸道補給營養而需依賴靜脈營養時之維他命補給。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
將 PART II 加入 PART I 中混合溶解後，加入高熱量靜脈營養輸液中，以中央靜脈點滴輸注之。成人通常一天一劑，可依年齡，症狀加以適當增減。

三、使用時我該注意的特別事項？

(1) 本劑避免單獨使用。

(2) 本劑 PART I ,PART II 混合溶解後，應迅速加入高熱量輸液中稀釋後才能使用，通常應在 12小時內使用完。

(3) 應注意所使用的配合輸注液對維他命之加速分解情形。

(4) 為防止維他命被光分解，因此在貯存，溶解使用時，均應避光。

(5) 本劑 PART II 是安瓿包裝，使用時應先用酒精棉擦拭切割之部份再與 PART I 混合溶解後，在無菌操作下加於輸注液內稀釋後供使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

(1) 休克：雖極少有引起休克之現象，但亦必須細心觀察，若有血壓下降、悶胸及呼吸困難時，應立刻停止使用，並做適當之處理。

(2) 過敏症：偶有發疹、臉部潮紅之發生，若有此現象，應立即停止使用。 (3) 消化系統：偶有腹痛、下痢、食欲不振、噁心之發生。

(4) 肝臟：有時會引起GOT、GPT及Al-P上昇之現象。

(5) 其他：偶而會引起高鈣血症。

六、此藥儲存時的條件為何？

本藥品須冷藏(2~8℃)，避光貯存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03