


用藥指導單張

衛教小組 DQ7230101

學名：Fluorouracil

商品名：5-FU INJ★1G/20ML

中文名：好復注射液



一、此藥品的用途是什麼？

消化器癌(如胃癌、直腸癌、結腸癌)、肺癌、乳癌病狀之緩解。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

起始劑量：

每日一次從靜脈注入12 mg/kg，連續4 天，每日劑量不超過800 mg 為宜。如果沒有中毒現象，在6、8、10、12 天時，各投予6 mg/kg。而在第5、7、9 和11 天時，不用投藥。即使一直沒有中毒，在第12 天結束時，就要停藥了。(詳警語和預防) 病況較改善的患者，或營養不佳者(詳禁用和警語)應給予6mg/kg/日，共3 日。如沒有中毒現象，在第5、7、9 天時，各給予3 mg/kg。在第4、6、8 天時，則不用投藥。每日劑量不應超過400 mg。以上二種連續注射的計劃皆構成“療程”。當有任何中毒現象時，應立即停止治療。

維持療法：

尚未有中毒出現，採下面二者之一來持續治療：

1. 前一療程最後一天結束之後，每30 天重複第一個療程的劑量。 2. 當治療的起始劑量導致中毒信號減退時，應服用單劑10-15mg/kg/週以做為維持劑量。不要超過1 g/週。病況較差的患者應減少劑量。考慮患者對前一個療程的反應，並根據情況來調整劑量。有些病人在12-60 個月內，接受了9 至45 次的療程。

輸注：

每日劑量15mg/kg，但每一針注射劑不可有超過1g的藥稀釋於500ml 5%葡萄糖或0.9%氯化鈉注射劑之中，然後以4小時的時間，以每分鐘40滴的速度從靜脈注入。或者每日劑量以30-60分鐘注入，或於24 小時內連續注入。直到有中毒現象前，應連續幾日服藥，或直到已給予12-15g。此連續注射構成了一個“療程”。有些患者以每日最高的1g劑量，共接受30g。每日劑量絕不可超過1g，任何二個療程之間，應間隔4-6週。

三、使用時我該注意的特別事項？

當下列中毒現象之一出現時，應馬上停藥：

口腔炎或食道炎，第一個可見到的信號出現時。

白血球減少(WBC 數小於3,500)或白血球細胞數急遽減少。

難控制的嘔吐。

腹瀉、經常性的bowel movements 或水性糞。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ7230101

學名：Fluorouracil

商品名：5-FU INJ★1G/20ML

中文名：好復注射液



胃腸潰瘍和出血。

血小板減少症(血小板數小於100,000)。

出血。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

口腔炎和食道炎(可能引起脫皮和潰瘍)、腹瀉、食慾減退、噁心、嘔吐。

六、此藥儲存時的條件為何？

本產品放置於緊封的容器中，可常溫25℃以下儲存，避免光線照射。

本產品於無菌層流環境下，經無菌操作開瓶後原液可在25℃以下室溫維持物化特性穩定72小時，然開封後產品的無菌性須由調劑之操作人員確保。

Fluorouracil注射劑可和0.9%氯化鈉注射劑或5%葡萄糖注射液相稀釋，該稀釋液可在室溫下穩定72小時，避免光線照射。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師