用藥指導單張

衛教小組 DB11380101

學　名：Beclometasone+Formoterol

商品名：foster(定量)(冷藏) 120dose

中文名：肺舒坦定量吸入劑

一、此藥品的用途是什麼？

氣喘

Foster NEXThaler適用於需規律使用吸入型皮質類固醇與長效beta 2-致效劑合併治療的氣喘病患。

慢性阻塞性肺病 (COPD)

患有較嚴重之慢性阻塞性肺病(FEV1少於預測值之50%)及 有反覆惡化病史，已定期使用長效型支氣管擴張劑，而仍有明顯症狀病患之治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
Foster NEXThaler應以吸入方式使用。

氣喘
成人（18 歲及以上）患者的劑量建議：
一天2次，每次吸入1或2劑。每日劑量上限為1天4劑。

慢性阻塞性肺病 (COPD)
成人（ 18 歲及以上）患者的劑量建議：
一天2次，每次吸入2劑患者從吸入器吸氣時，應盡可能在站立時或坐姿時保持直立的姿勢。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 欲停止治療時，建議應逐步調降劑量，不可突然中斷治療。
2. 不應作為氣喘的第一線治療。
3. 應建議患者每次吸入處方劑量後，以清水清洗口腔或漱口、或者刷牙，以降低口咽部真菌感染和發聲困難的風險。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.10.17

用藥指導單張

衛教小組 DB11380101

學　名：Beclometasone+Formoterol

商品名：foster(定量)(冷藏) 120dose

中文名：肺舒坦定量吸入劑

五、此藥會造成什麼副作用？

咽炎、口腔念珠菌感染、發音困難、頭痛、顫抖。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 發藥前：請儲存於冰箱（2-8° C）（最長可存放 15 個月）。
2. 發藥後：請勿儲存於 25° C 以上環境（最長可存放 5 個月）。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院
Kuang Tien General Hospital

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.10.17