用藥指導單張

衛教小組 DK3570101

學　名：Loratadine 5mg + Pseudoephedrine 120mg

商品名：MINLIFE-P(不能剝半及磨粉)

中文名：特敏福持續性藥效錠



一、此藥品的用途是什麼？

緩解過敏性鼻炎及感冒的相關症狀，如鼻塞、打噴嚏、流鼻水、搔癢及流眼淚。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人及十二歲以上小孩一次一錠，每天兩錠。

三、使用時我該注意的特別事項？

擬交感神經作用藥物應小心使用於青光眼，消化性潰瘍狹窄，幽門十二指腸阻塞，前列腺肥大或膀胱頸阻塞、心臟血管疾病，眼內壓增高或糖尿病之病人。擬交感神經作用藥物應小心使用於同時接受digitalis治療之病人。擬交感神經作用藥物可能會引起中樞神經刺激，興奮或痙攣的作用及(或)產生低血壓合併心臟血管性虛脫。

對於年紀大於60歲以上之病患，應小心服用，因為擬交感神經藥物可能會對其造成迷惑，幻覺，痙攣，中樞神經系統抑鬱，甚或死亡之逆反應。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：　在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

失眠、口乾。

六、此藥儲存時的條件為何？

於25℃以下儲存，避免潮濕。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.29