
用藥指導單張

衛教小組 DE1730101

學　名：Calcitriol

商品名：MACALOL 0.25UG(自費)

中文名：骨活醇軟膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

佝僂症、軟骨症、促進磷、鈣之吸收、維他命D缺乏症、過敏性疾患。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
開始時1天0.25mcg，必要時可每隔2～4週每天的劑量增加0.25mcg，直到獲得滿意的反應為止。一般的維持量為0.5mcg～1mcg/天。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 治療期間定期測定血中鈣，磷酸鹽，鎂和鹼性磷酸脂酶和24小時尿中的鈣和磷量(治療初期每週2次測血中的鈣)。發生高鈣血時，要立刻停藥。
2. 孕婦使用要格外小心。孩童的安全性與功效，尚未確定。
3. 留意嘔吐，虛弱，或肌肉或骨頭疼痛，因為這些症狀可能表示高鈣血症。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

嘔吐、虛弱、肌肉或骨骼疼痛、高鈣血症。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03