

用藥指導單張

衛教小組 DQ11490101

學名：Triptorelin

商品名：diphereline p.r ★ 3.75mg (健保事審) (低劑量)

中文名：達菲林長效注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

攝護腺癌之輔助療法、子宮內膜異位症、子宮肌瘤切除手術前縮減子宮肌瘤體積之輔助治療、性早熟之治療、女性不孕症在體外受精及胚胎植入〔IVF-ET〕之輔助治療、停經前早期乳癌。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

僅限於肌肉注射。

使用前將粉末與所提供的溶劑混合並充分搖勻成均質液劑後立即注射。

攝護腺癌

兩種治療方式可選擇：

1. 每天皮下注射速放型的Diphereline 0.1mg 連續七天，且於第8 天肌肉注射Diphereline P.R. 3.75mg；四週後重覆一次。

2. 或自一開始即每四週肌肉注射一瓶Diphereline P.R. 3.75mg。治療持續時間：臨床數據顯示，當與放射線同時治療局部晚期攝護腺癌的病人時，男性荷爾蒙去除療法（ADT）應持續2-3 年。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

熱潮紅、勃起困難及性慾低落。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存溫度不可高於25° C。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師