# 用藥指導單張

衛教小組 DA7720301

學　名：Nimodipine 0.2mg/ml

商品名：NIMOTOP INFUSION 50CC（注射）

中文名：腦妥靜脈輸注液




## 一、此藥品的用途是什麼？

預防、治療蜘蛛膜下出血後、腦血管痙攣所引起的缺血性神經缺損。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
IV Form：體重70KG以下或血壓不足者開始治療時，前兩小時每小時0.5毫克的Nimodipine。體重70KG以上每小時1毫克Nimodipine的速度注射2小時，若無副作用則可加倍劑量繼續給予。Oral Form：注射10～14天後，建議口服Nimotop膜衣錠，每天6次，每次60毫克，約七天。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

(1)Nimotop IV不可直接加入注輸袋或注輸瓶中，應利用Y型管血旁邊注入正在滴注其他輸液之注輸管中。(2)Nimotop只能使用PE或PP的注輸管不可用PVC的注輸管。(3)Nimotop需配合Syringe Pump給予。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

## 五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛，面部潮紅，胃部症狀，嘔心，灼熱感和血壓降低。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20