

用藥指導單張

衛教小組 DB5730101

學名：Budesonide+Formoterol

商品名：symbicort (氣化噴霧)rapihaler 120 dose

中文名：吸必擴氣化噴霧劑



一、此藥品的用途是什麼？

氣喘 (Asthma)

Symbicort Rapihaler 適用於適合使用吸入型皮質類固醇及長效 β_2 作用劑 (β_2 -agonist) 合併治療的氣喘 (asthma) 常規治療。

以吸入型皮質類固醇和“需要時”吸入短效 β_2 作用劑未能充分控制氣喘的患者。

慢性阻塞性肺部疾病 (COPD)

Symbicort Rapihaler 適用於患有中至重度COPD，頻繁出現症狀及有惡化病史之患者的常規治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

氣喘

成人(18歲以上)： 每天2次，每次吸入2劑。

有些患者可能需要每天2次，每次吸入多達4劑，作為維持劑量。

青少年(12-17歲)： 每天 2 次，每次吸入 2 劑。

慢性阻塞性肺部疾病 (COPD)

成人(18歲以上)： 每天 2 次，每次吸入 2 劑。 每日最大劑量：吸入4 劑。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 要停止治療時，建議以逐漸降低劑量的方式停藥，而且不可突然停藥。
2. 患者應被告知要隨時攜帶急性緩解之吸入劑。
3. 為減少口腔咽喉發生念珠菌感染的風險，應教導患者在每次吸入維持劑量後用水漱口。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DB5730101

學名：Budesonide+Formoterol

商品名：symbicort (氣化噴霧)rapihaler 120 dose

中文名：吸必擴氣化噴霧劑



五、此藥會造成什麼副作用？

心悸、口咽念珠菌感染、頭痛、顫抖、咽喉輕微刺激、咳嗽、嘶啞。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 拆開箔袋之後，保存期限是3個月。
2. 請勿存放於30°C以上。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師