# 用藥指導單張

衛教小組 DA1160101

學　名：Losartan100mg, Hydrochlorothiazide12.5mg

商品名：HYzaar(複方)100MG/12.5MG

中文名：好悅您膜衣錠




## 一、此藥品的用途是什麼？

高血壓。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
每日一次，每次一錠。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本品不可以一開始就使用在血管內容積不足之病患(例如以高劑量利尿劑治療之患者)。
2. 本品不建議使用在嚴重腎功能受損(肌酸酐廓清率≦30mL/min)或肝功能受損之病患。
3. 如同所有抗高血壓之治療，在一些病患可能發生有症狀的低血壓。必須注意病人是否有體液或電解質不平衡的臨床徵兆，如容積不足、低血鈉症、低血氯性鹼中毒、低血鎂症和低血鉀症，這些徵兆可能在併發腹瀉或嘔吐時發生
4. 若於懷孕第二期及第三期時服用直接作用於腎素—血管收縮素系統之藥物，會使發育中之胎兒受損及甚至死亡；故一旦測知懷孕後，必須儘快停用本品。
5. 接受thiazide治療時，某些病人會發生高尿酸血症或痛風惡化的情形。因為losartan會降低尿酸，因此losartan併用hydrochlorothiazide可減輕利尿劑引起的高尿酸血症。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

## 五、此藥會造成什麼副作用？

咳嗽、發燒、喉嚨痛、頭暈、背痛、腹瀉、疲倦、鼻塞。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03