用藥指導單張

衛教小組 DM6550201

學　名：Cefepime

商品名：antifect INJ.1G

中文名：革菌素注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

對Cefepime具感受性之細菌性感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1.成人常用劑量（包括13歲以上的兒童）為每12小時靜脈注射或肌肉注射，治療期約7~10天，如果嚴重感染時治療期可能需要延長。 2.靜脈注射適用於嚴重感染或對生命具有威脅性的病人，特別是如果出現休克時。靜脈注射本品時須加入5或10ml滅菌注射用水，5%葡萄糖水或0.9%NaCl，以3~5分鐘以上緩慢注射於靜脈或以靜脈輸注。

3.肌肉注射：本品依下列所述加量加入下列溶劑在室溫下可置24小時或冰箱內放置7天仍具安定性：注射用水；0.9%NaCl注射液；5%葡萄糖水注射液；含parabens或benzyl alcohol的抑菌注射水或0.5%或1% lidocaine hydrochloride。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.肝功能不全者無需調整劑量；腎功能不全者需要調整劑量，詳請請見仿單；如與有腎毒性潛力之藥品併用時應小心監測其腎功能。 2.當本藥使用嚴重過量時，特別是腎功能障礙的病患，需以透析法將本品排出體外(血液透析法較腹膜透析法適用)。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常見的副作用為腸胃道症狀(噁心、嘔吐)和過敏反應(皮疹、皮膚癢、蕁麻疹)

六、此藥儲存時的條件為何？

antifect粉末應避光貯存在25度以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26