

用藥指導單張

衛教小組 DQ1190101

學名：Gefitinib

商品名：IRESSA ★ 250MG

中文名：艾瑞莎膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

1. 適用於具有EGFR-TK突變之局部侵犯性或轉移性之非小細胞肺癌 (NSCLC) 病患之第一線治療。
2. 適用於先前已接受過化學治療後，但仍局部惡化或轉移之肺腺癌病患之第二線用藥。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. IRESSA之劑量為250mg錠劑，口服，每天一次，可空腹或與食物併用。如忘記服藥時，想起時應立刻補服一次劑量，若是離下次服藥時間不到12小時，則跳過忘記的劑量，不可同時服用兩倍的劑量。
2. 錠劑可於半杯飲用水（非碳酸類）中崩散，不應使用其他液體。將錠劑放入水中，不要壓碎，攪拌直到錠劑崩散（約10分鐘）後，立刻喝下此溶液，再以半杯水沖洗杯緣並喝下。另外，此溶液也可用鼻胃管餵食。
3. IRESSA並不建議供兒童或青少年使用，因尚未對此族群進行安全性及有效性之研究。
4. 無論患者之年齡、體重、性別、種族或腎功能狀況如何，或患者因肝臟之轉移而有中度至重度之肝功能受損，均無須調整劑量。
5. 劑量調整：若病人對藥物引起之腹瀉或皮膚不良反應，難以耐受時，可藉著短期地中斷治療（直到14天）來解決，其後再以250mg之劑量重新開始。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 服用Iressa之患者，曾發生少見之間質性肺病，其可能係急性發作，有些患者因而致命。患者若同時合併有自發性肺臟纖維化/間質性肺炎/塵肺症/輻射性肺炎/藥物引起之肺炎時，在此種情況下其死亡率會增加。如果患者出現呼吸症狀之惡化，如呼吸困難、咳嗽及發燒時，應停止用Iressa治療，並立即著手調查。當確認是間質性肺病時，應停用Iressa，並給患者適當之治療。
2. 曾發現無症狀之肝臟轉氨酶上升。因此建議定期檢查肝功能。對肝臟轉氨酶輕度至中度上升者，使用IRESSA應特別謹慎。若變化較嚴重時，應考慮停藥

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ1190101

學名：Gefitinib

商品名：IRESSA ★ 250MG

中文名：艾瑞莎膜衣錠



3. 會誘發CYP3A4活性之物質可能會促進代謝且降低血漿中gefitinib之濃度。因此，與CYP3A4誘發物質(如phenytoin、carbamazepine、rifampicin、巴比妥類或St John's草)併用時，可能會降低效力。

4. 有報告指出：服用warfarin患者，有些發生國際標準化比值(INR)上升及/或出血。服用warfarin之患者，應定期檢查凝血酵素原時間(PT)或INR之變化。

5. 會使胃酸之pH值持續上升之藥物，可能會降低血漿中gefitinib之濃度，並因而降低其效力。

6. 懷孕及哺乳：IRESSA並無在懷孕或哺乳婦女使用之資料。動物實驗顯示有生殖毒性；動物實驗亦指出gefitinib及其部分代謝產物會進入鼠類之乳汁之中。

7. 對駕駛及機器操作能力之影響：在接受IRESSA治療期間，曾有衰弱之現象；曾有此症狀之患者駕駛及機器操作時，應小心監看。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

可能之不良反應：最常報告之藥物不良反應，發生於20%以上之患者，包括腹瀉、皮疹、皮癢、皮膚乾燥及面皰。不良反應通常發生於治療之第一個月，且通常為可逆性。約有10%之患者有嚴重之ADR(共同毒性標準(Common Toxicity Criteria, CTC)第3或4級)。大約有3%之患者因為ADR而停止治療。

六、此藥儲存時的條件為何？

貯存於30度C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師