

用藥指導單張

衛教小組 DC3330201

學名：Phenytoin

商品名：DILANTIN 100MG (抗癲癇)

中文名：癲能停膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

大發作及局部發作型癲癇，預防及治療神經外科手術所引起之癲癇發作。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人：

— 分次給藥

初劑量為100mg，每日服用3次，視病人需要調整之。一般維持劑量為100mg，每日2-3次，必要時可使用更低或更高劑量，亦視病人之狀況而調整之。由於一般本藥在藥動學及藥效學方面顯著之個體差異性，須小心監測病人之毒性反應、血中濃度，及臨床療效，並藉以適切調整每一位病人之劑量。

— 負荷劑量

有肝病或腎病病史之病人不適用此給藥法。

最初至多可投與1000mg，分3次給藥(400mg、300mg、300mg)，投藥間隔為2小時；24小時後改投與維持劑量，並密切監測病人之血中濃度。

兒童：

初劑量為每日每公斤體重5mg，分2-3次投與。每日最高劑量為300mg。通常維持劑量為每公斤體重4-8mg。6歲以上之兒童可採用成人最低劑量(每日300mg)。

以上劑量亦皆須視病人之個別狀況而調整之。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 依血中濃度調整劑量，使之維持於10-20 μ g/ml。
2. 初填劑量：若需快速達到穩定狀態血中濃度，卻不適宜靜脈注射時，可使用初填劑量，但應於可以監測血中濃度的醫療院所使用。有肝、腎疾病史者不可接受口服初填劑量療法。最初每隔2小時以400mg，300mg，300mg的劑量分3次給藥(總量1g)，24小時後再開始一般維持劑量，並經常監測血中濃度。
3. 服用本品的患者不宜開車或從事危險性的工作。
4. 本品會降低避孕藥的效果，宜採用其他避孕方法。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DC3330201

學名：Phenytoin

商品名：DILANTIN 100MG (抗癲癇)

中文名：癲能停膠囊



D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

齦肥厚、腳步不穩、意識混淆、眼球顫動、口齒不清。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫25° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師