

用藥指導單張

衛教小組 DD4050101

學名：Sulfasalazine

商品名：SALAZINE E.C. 500MG

中文名：撒樂腸溶錠



一、此藥品的用途是什麼？

潰瘍性結腸炎(Ulcerative Colitis)、Crohn's disease、類風濕性關節炎(Rheumatoid Arthritis)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

劑量應依病人之反應及適應情形而調整，對於未曾使用過本藥之病患建議先以低劑量開始，然後慢慢增加劑量，腸溶錠切勿咬碎。

發炎性腸道疾病(Inflammatory Bowel Disease)：

發作期：成人：嚴重發作—每次2~4 錠，每天3~4 次，可與類固醇併用。

中度發作—每次2 錠，每天3~4 次。小孩：每天每公斤體重40~60mg，分成3~6次服用。

預防復發：成人：平常維持每天2 錠，每天2~3 次，若惡化則增加每天3~4 次。

小孩：每天每公斤體重20~30mg，分成3~6 次服用。

類風濕性關節炎(Rheumatoid Arthritis)：

經驗顯示臨床效果可於使用一至二個月出現，使用時建議併用類固醇類止痛劑直至藥效出現。Sulfasalazine 長期使用有效且忍性良好。成人：每天2 錠，每天2 次，即一天2g，假如使用本藥治療二個月後無反應的話則可增加劑量至每天3g。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本藥應於醫師之監視下使用。
2. 曾有骨髓抑制(bone marrow depression)或血小板減少(leukocytopenia)之副作用報告發生，通常可於開始使用藥物後三個月內出現且停藥後副作用會消失。
3. 開始治療前應先檢查其血球數，尤其是白血球。病人應監視三個月，如此病人在臨床上若有輕微徵候，即可發覺，白血球數目減少是很大的指標。
4. 紅血球及血小板數應於使用前及定期檢查。
5. 腎及肝功能不良之病患應小心使用，且應定期檢查尿液及肝功能。
6. 若有嚴重之毒性或過敏反應時，應立即停用。
7. 葡萄糖六磷去氫(Glucose-6-phosphate dehydrogenase)缺乏之患

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DD4050101

學名：Sulfasalazine

商品名：SALAZINE E.C. 500MG

中文名：撒樂腸溶錠



者應密切注意有無溶血性貧血(Hemolytic anemia)發生。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常見之副作用有：噁心、食慾不振、體溫上昇、紅斑、癢、頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於15～30° C，密蓋容器。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師