

用藥指導單張

衛教小組 DL3430101

學名：Clozapine

商品名：MEZAPIN 25MG

中文名：可洛拉平錠



一、此藥品的用途是什麼？

其他藥物治療失效的精神分裂症病患。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

劑量應因人而異，而對每一位病人應使用最低劑量而有效的藥，以下之劑量為口服之使用量：

最初量：

第一天服用12.5~25 mg；接著第2天可以用25~50 mg。若可以承受則劑量可每天增加25~50 mg，於7~14天之內達到每天300 mg之劑量。之後，視病情需要，可在4天或1週後以50至100mg的每天劑量再增加。

治療劑量的範圍：

大多數病患，以分次給藥的方式，若每天投以 300 ~ 450 mg，則可預期達到抗精神病病之效果。有部分病人需要用 600 mg 分次給藥可以不均等的方式投予，而在睡前給予較大的劑量。

最大劑量：

基於達到最大劑量之治療效果，有少部份的人可能需要更高劑量，像這樣的人應慢慢地調整劑量（每次量不應增大於100mg）以達每天900mg之最大劑量。當劑量超過每天450mg時，應小心發生不良反應之可能性了。

維持劑量：

在達到最大劑量之療效之後，許多患者即可以較低之劑量有效地達到維持的效果。應小心地慢慢減量，治療時間必須在6個月以上。若能調整到每天劑量不超過200mg時，則每天傍晚服用一次的方式服藥即可。

三、使用時我該注意的特別事項？

因為本品與無粒性白血球病症之發生有關係，因此下列事項應特別注意：本品應避免和一些容易造成無粒性白血病的藥物一起服用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL3430101

學名：Clozapine

商品名：MEZAPIN 25MG

中文名：可洛拉平錠

最常見的副作用是疲勞、昏睡、鎮靜作用、頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

應置於25℃以下避光貯存。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師