


用藥指導單張

衛教小組 DD3900101

學名：Dimethylpolysiloxane

商品名：KASCOAL 40MG

中文名：加斯克兒錠



一、此藥品的用途是什麼？

解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1天3至4次，或需要時服用。

成人每次1錠，3歲以上（含），適用成人劑量。

3歲以下嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 須置於小孩接觸不到之處。 2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。 3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。 4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

本藥耐受性良好，針對某些患者偶有軟便、胃部不快感、下痢、腹痛、嘔吐、嘔氣、胃部重壓感及食慾不振等現象。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。 2. 室溫（15-30℃）、避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師