用藥指導單張

衛教小組 DG15780101

學　名：Sildenafil

商品名：viagra od film(口溶膜) 50mg(自費)

中文名：威而鋼口溶膜



一、此藥品的用途是什麼？

成年男性勃起功能障礙。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

劑量

成人

VIAGRA應視需要於性行為前約1小時服用。建議劑量為50毫克空腹服用，因為與食物併服會減慢吸收速率，並會延遲口溶膜的作用。視藥效與耐受性而定，可將劑量提高至100毫克。最大建議劑量為100毫克。須將劑量提高至100毫克的病人應連續服用兩片50毫克口溶膜。最高建議服藥頻率為每日一次。如須使用25毫克的劑量，應建議病人使用25毫克膜衣錠。

用法

口服使用。

應小心地撕開鋁箔小袋(不要切割開)。應以乾燥的手指拿取口溶膜置於舌面上，待溶散後再用水送服，或不用水直接吞服。將口溶膜自鋁箔小袋中取出後應立即服用。對須服用第二片50毫克口溶膜以達到100毫克劑量的病人，應於第一片口溶膜完全溶散後再服用第二片。

建議空腹服用口溶膜。口溶膜可用水送服，亦可不用水直接吞服。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：　在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、潮紅、消化不良、鼻塞、頭暈、噁心、熱潮紅、視覺異常、藍光幻視(cyanopsia)和視覺模糊。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.17

用藥指導單張

衛教小組 DG15780101

學　名：Sildenafil

商品名：viagra od film(口溶膜) 50mg(自費)

中文名：威而鋼口溶膜



儲存於30° C 以下。請保存於原始包裝中，以避免接觸濕氣。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.17