
用藥指導單張

衛教小組 DA0590101

學　名：Dronedarone

商品名：MULTAQ 400MG

中文名：脈泰克膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

本品適用於最近六個月內有陣發性或持續性心房纖維顫動(AF) 或心房撲動(AFL)，且目前處於竇性節律（sinus rhythm）狀態或即將接受治療成為正常節律的患者，可降低病患發生心血管疾病而住院的風險：

年齡70歲以上，曾有過心房纖維顫動（AF）或心房撲動（AFL）之病患；

65≦年齡<70歲，且帶有下列心血管相關危險因子之一的患者（例如，高血壓、糖尿病、曾發生過腦血管意外、左心房直徑50 mm或左心室射出率[LVEF] <40%）

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人建議劑量只有一種，即每次400mg，每日兩次。服用方式為早晚各一錠，與早餐及晚餐併服。開始治療前，必須先停用第I類或第III類抗心律不整藥物 （如：amiodarone、flecainide、propafenone、quinidine、disopyramide、dofetilide、sotalol）或CYP3A強效抑制劑（如：ketoconazle）

三、使用時我該注意的特別事項？

病患應被告知，若出現心衰竭的症狀或徵兆（例如，體重增加、依賴性水腫、或呼吸急促的情況增加），必須向醫師諮詢。然而，心房纖維顫動(AF)/心房撲動(AFL)的患者在MULTAQ治療期間出現心衰竭惡化的資料並不多見。若有心衰竭的情況出現或惡化，可以考慮將MULTAQ暫時停藥或完全停藥。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：　不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

腹瀉、噁心、腹痛、全身性無力感。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於30℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.06