

用藥指導單張

衛教小組 DE11780101

學名：Saxagliptin

商品名：ONGLYZA 2.5MG

中文名：昂格莎膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

第二型糖尿病。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

建議劑量為每日一次2.5毫克或5毫克，可單獨使用亦可與metformin、sulfonylurea、PPAR作用劑（如thiazolidinedione）合併使用，做為附加於飲食控制及運動之外的治療藥物，藉以改善第二型糖尿病患的血糖控制效果。可與食物併服或空腹服用。

腎功能不全病人之劑量

對 $eGFR \geq 45\text{mL/min/1.73m}^2$ 的病人，不建議調整劑量。對 $eGFR < 45\text{mL/min/1.73 m}^2$ （包括中度或重度腎功能不全的病人或需要接受血液透析的末期腎病的病人，ONGLYZA 劑量為每日一次 2.5 毫克（不論是否用餐）。ONGLYZA 應在血液透析後給藥。ONGLYZA 未曾針對腹膜透析病人進行研究。由於腎功能不全病人的 ONGLYZA 劑量最高為 2.5 毫克，因此建議開始 ONGLYZA 治療前應先評估腎功能，此後亦應定期進行評估。

三、使用時我該注意的特別事項？

胰島素分泌刺激劑如磺脲類(sulfonylurea)，會造成低血糖。因此與本品併用時，胰島素分泌刺激劑的劑量可能需要降低，以減少低血糖的風險。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

上呼吸道感染、頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於 30°C 以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師