用藥指導單張

衛教小組 DQ8670201

學　名：Trastuzumab emtansine

商品名：kadcyla ★ 100mg(低劑量)(健保事審)

中文名：賀癌寧凍晶注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

KADCYLA 單獨使用時能夠治療 HER2 陽性、之前分別接受過 trastuzumab 與一種 taxane 藥物治療或其合併療法的轉移性乳癌病患。

說明: 病患應符合下列條件：

之前已經接受過轉移性癌症治療，或

在輔助療法治療期間或完成治療後 6 個月內癌症復發。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
KADCYLA 建議的劑量為 3.6 mg/kg，每 3 週(為期 21 天的周期)靜脈輸注一次，直到病情惡化或出現無法接受的毒性為止。請勿施打高於 3.6 mg/kg 的 KADCYLA 劑量。請勿以 KADCYLA 代替 Trastuzumab 或 Trastuzumab 取代 KADCYLA。

在施打藥物期間，請仔細監測輸注部位可能出現的皮下浸潤。

第 1 次輸注：輸注 90 分鐘。應在輸注過程中及施打起始劑量之後至少 90 分鐘內，觀察病患是否出現發燒、冷顫或其他輸注相關的反應。

後續輸注：若之前輸注耐受情況都很好，請輸注 30 分鐘。應在輸注過程中及輸注後至少 30 分鐘內觀察病患的反應。

三、使用時我該注意的特別事項？

配製後的溶液不可冷凍。

將配製後的 trastuzumab emtansine 溶液注入裝有 0.9%氯化鈉注射液或 0.45%氯化鈉注射液的聚氯乙烯(PVC)輸注袋或不含乳膠、不含 PVC 的聚烯烴輸注袋稀釋之後，在使用前可於 2-8° C 的溫度下保存達 24 小時。如果是以 0.9%氯化鈉注射液稀釋，存放期間可能會出現微粒物質，因此，輸注投藥時必須使用 0.2-0.22 微米、不會吸收蛋白質的線內聚醚碸(In-line non-protein adsorptive polyethersulfone)過濾器。

不相容性

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.17

用藥指導單張

衛教小組 DQ8670201

學　名：Trastuzumab emtansine

商品名：kadcyla ★ 100mg(低劑量)(健保事審)

中文名：賀癌寧凍晶注射劑



不可使用葡萄糖(5%)溶液，因為會導致蛋白質凝集。 Trastuzumab emtansine 不可與其他藥物混合使用或以其他藥物進行稀釋。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級： 在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

可能有便秘、頭痛、骨骼肌肉疼痛、噁心、疲倦的情形。

六、此藥儲存時的條件為何？

請將小瓶裝藥品儲存於 2-8° C 的環境中。

以無菌注射用水配製的小瓶裝藥品應於配製後立即使用。若未立即使用，配製後的小瓶裝藥品可於 2-8° C 的溫度下保存達 24 小時，之後則必須丟棄。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.17