

用藥指導單張

衛教小組 DC5140101

學名：Risperidone

商品名：SPITERIN ORAL SOL'N 1MG/ML, 30ML(液劑)

中文名：思特寧內服液劑



一、此藥品的用途是什麼？

思覺失調症之相關症狀，雙極性疾患之躁症發作。治療失智症病人具嚴重攻擊性，或思覺失調症類似症狀。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

思覺失調症

成人

每日服用Risperidone 一次或二次。病人須從Risperidone 2mg/day 開始給藥。劑量可在第二天增至4mg。其後劑量可維持不變或必要時視個別情況予以調整。大部份病人的最適劑量為每日4~6mg。

老年人

建議起始劑量為每天兩次每次0.5mg。劑量可視個別情況調整，以每天兩次每次0.5mg 之速度增加劑量，增至每天兩次每次1~2mg。

失智症的行為混亂

建議起始劑量為每天兩次每次0.25mg。劑量可依個別情況調整，必要時增加速度為每天兩次每次0.25mg，最快可每兩天調整一次。大部份病人的最適劑量為每天兩次每次0.5mg。

雙極性疾患之躁症發作

成人

Risperidone 須每日給藥一次，起始劑量為2mg或3mg。必要時，劑量調整的間隔不得低於24小時，且劑量增加速度最高為每天1mg。每日超過1~6mg 的彈性劑量曾觀察到療效，如同所有的症狀治療，需持續評估病人狀況，以決定是否繼續使用Risperidone。

三、使用時我該注意的特別事項？

Risperidone可能會干擾需要警覺性的活動。因此，應警告病人在恢復個人敏感度以前不得駕駛或操作機械。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DC5140101

學名：Risperidone

商品名：SPITERIN ORAL SOL'N 1MG/ML, 30ML (液劑)

中文名：思特寧內服液劑

的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

失眠、激躁、焦慮、頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

請置於25℃以下之乾燥處避光貯存。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師