用藥指導單張

衛教小組

學　名：Potassium chloride

商品名：0.298% KCL IN 0.9% NACL INJ. 500ML（高劑量）

中文名：0.298%氯化鉀注射液（K=20mEq）



一、此藥品的用途是什麼？

治療鉀缺乏症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 成人－

靜脈輸注的劑量和速率視每個病患個人需求而定，每日可以使用到400mEq的K＋（通常不超過3mEq/Kg）。先輸注投與40～60mEq後，再依測得的病患的血鉀濃度和心電圖，來決定後續輸注所需的速率。當血鉀濃度大於2.5mEq/L時：每日可以使用到200mEq的K＋，以濃度小於30mEq/L，且每小時不超過10mEq的速率靜脈輸注。當血鉀濃度小於2mEq/L時，且心電圖改變或麻痺時（緊急治療）：可以使用到每日400mEq的K＋以適量濃度，通常每小時不超過20mEq的速率靜脈輸注。 2. 孩童－

每日可以使用到3mEq/Kg或40mEq/m2的K＋。投與的輸注液體積依身體大小調整。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 不可使用於尿少症患者。
2. 嚴重腎臟疾病、Addison氏病、急性脫水中暑性痙攣、高血鉀症，不可使用本藥。
3. KCl注射之正確用量必須依病人血鉀之濃度，心電圖之結果而定。使用鉀鹽製劑，應格外小心，以免引起中毒現象。故需特別注意隨時監測，若鉀離子過高則需中止使用。
4. 授乳期應小心使用。
5. 代謝性酸中毒併有鉀低血症時，應使用鹼性鉀鹽（如Potassium bicarbonate, Citrate, Gluconate, Acetate）
6. 有心臟疾病時要謹慎使用，尤其是併用Digitalis或同時有腎衰竭、代謝性酸中毒、Addison’s等疾病的病人。此外，長期或嚴重腹瀉、腎上腺功能不全、家族性週期性麻痺、低血鈉症、先天性肌強直症也要小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.18

用藥指導單張

衛教小組

學　名：Potassium chloride

商品名：0.298% KCL IN 0.9% NACL INJ. 500ML（高劑量）

中文名：0.298%氯化鉀注射液（K=20mEq）



五、此藥會造成什麼副作用？

1. 高血鉀症：症狀包括四肢感覺異常、鬆弛性麻痺、反射消失、無力感、無精打采、精神紊亂、腿無力、低血壓、心律不整、心跳停止與心電圖異常。
2. 其它：噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉。

六、此藥儲存時的條件為何？

25℃以下避光貯存，避免冰凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.18