

用藥指導單張

衛教小組 DK9960101

學名：Amoxycillin+Clavulanic acid

商品名：CURAM（口溶錠）1000MG DISPERSIBLE TAB

中文名：諾快寧口溶錠



一、此藥品的用途是什麼？

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

治療感染的一般劑量

成人與12歲以上的兒童

重度感染：

1. Curam 1000毫克口溶錠一顆，每日服用二次治療的方式可先以注射的方式開始給藥，再改以口服的方式繼續給藥。

2. Curam 1000毫克口溶錠並不建議使用於12歲以下的兒童

腎功能受損病人的使用劑量

Curam 1000毫克口溶錠只可使用於腎絲球過濾速率>30毫升/分鐘的病人給藥

口溶錠可先與半杯水（至少30ml）攪拌後再吞服；或是放入口中，待口溶錠崩散後再吞服。

為了將此藥物對腸胃所造成的不適降至最低，應於用餐開始時服用。此藥在用餐開始時服用可得到最佳吸收效果。

如未重作評估，此藥之使用不可持續超過14天。

三、使用時我該注意的特別事項？

有些病人在接受Curam治療後會出現流血時間以及凝血時間延長的情形。對於正在接受抗凝血療法的病人，Curam的使用應特別小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

感染：

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DK9960101

學名：Amoxycillin+Clavulanic acid

商品名：CURAM（口溶錠）1000MG DISPERSIBLE TAB

中文名：諾快寧口溶錠



皮膚黏膜念珠菌症

腸胃道

成人：極常見：腹瀉。常見：噁心、嘔吐

兒童：常見：腹瀉、噁心、嘔吐

六、此藥儲存時的條件為何？

Curam 錠劑應儲存在未開封之原始包裝中，並置於乾燥處保存，貯存勿超過25度。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師