用藥指導單張

衛教小組 DR11200101

學　名：Lidocaine

商品名：(心室不整用) LIDOCAINE ★ AMP 2% 5ML

中文名：利多卡因靜脈注射液2%



一、此藥品的用途是什麼？

心室性不整律之急性治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

靜脈一次給藥法

通常成人一次50~100mg (1-2mg/kg) (2%注射液2.5~5ml)以1~2 分鐘的時間，緩慢地靜脈注射。效果不彰時，在5 分鐘後給與相同的劑量。另外，期待效果得以持續時，以間隔10~20 分鐘的時間追加給與相同的劑量也無妨，但是1 小時內最高的基準給藥量是300mg (2%注射液：15ml)。

本藥靜脈注射的效果，一般在10~20 分鐘後消失。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 慎重給藥(對下列患者應慎重給藥)

依文獻記載

(1) 有輕度刺激傳導障礙的患者(會有引起高度的傳導障礙之虞)。

(2) 有顯著的竇性心搏過慢的患者(會有引起症狀惡化之虞)。

(3) 低血容的患者、在休克狀態的患者、或者有心臟衰竭的患者(會有引起心跳停止之虞)。

(4) 有嚴重的肝功能或腎功能障礙的患者(會因代謝遲緩而有引起血漿中濃度上升之虞)。

(5) 老年人。

2. 重要的基本注意事項 依文獻記載

(1) 為避免給藥過量，須儘可能(點滴給藥時一定需要)在頻繁的血壓測量和心電圖的連續監看下給藥。

(2) 與Disopyramide(抗心律不整藥)、Terfenadine併用，可能與QT延長、心室性心律不整產生有關。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.06

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

用藥指導單張

衛教小組 DR11200101

學　名：Lidocaine

商品名：(心室不整用) LIDOCAINE ★ AMP 2% 5ML

中文名：利多卡因靜脈注射液2%



五、此藥會造成什麼副作用？

眩暈、嗜睡。

六、此藥儲存時的條件為何？

避光儲存於25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.06