用藥指導單張

衛教小組 DM3230101

學　名：Cortisone

商品名：CORTISONE ACETATE 25MG

中文名：乙酸可體松錠



一、此藥品的用途是什麼？

風濕性關節炎、急性風濕熱、過敏性病、炎症性眼病、皮膚病、贅生性疾病及阿迪生氏病。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1.類風濕性關節炎之劑量：每24小時內給100mg，連用二星期或至療效出現為止，然後逐漸減低劑量，每次減5mg或更多些，一直提截至最小合適之維持劑量，（最理想者為每日使用50～75mg.或低於此量）。

2.急性風濕熱之劑量：第一天給400mg.分成數次服用，以後每天200mg.也分成數次服用，直至療效出現，及改用每天50mg或少於此量的維持劑量續服6～8星期。

3.阿迪生氏病之劑量：每日10～25mg，佐以4～9克之氯化鈉，或1～3mg之Desoxycorticosterone Acetate，已維持血內電解質之量而使病況進步。

4. 治療其他各病之劑量與類風濕性關節炎之用量相似，不過對於腎上腺性徵異常症之用量應視個別之需要不同而定，而喉頭水腫及嚴重哮喘須用大劑量（第一二天為300 至500mg.），以後即用維持劑量或停藥，慢性哮喘患者須長期使用，療效顯著。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 心臟儲存血量減少，充血性心臟衰竭，高血壓，精神病傾向，糖尿病，腎機能不足，久病健康不良、胃潰瘍，衰老、最近手術以後如腸吻合術。有活動性或可疑性癒合之結核病灶時，暫時不要應用本劑，於其他急性或慢性細菌炎症時，本品可以使用，但須併用抗生素及化學療法。
2. 限制鈉鹽之攝取、矯正低鉀血症。
3. 結核病、活動性或消化性潰瘍患者應禁用。
4. 需控制血糖過高。故高血壓、糖尿病患者服用應多加注意。
5. 除去阿迪生氏症及其他必要條件，本劑不能與其他荷爾蒙劑併用。
6. 急性及慢性傳染炎症服用本劑時，應同時治療傳染病灶。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

用藥指導單張

衛教小組 DM3230101

學　名：Cortisone

商品名：CORTISONE ACETATE 25MG

中文名：乙酸可體松錠



C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

避免身心過度疲勞。如發現有副作用(如失眠、多毛、粉刺等)產生時需暫時停藥。

六、此藥儲存時的條件為何？

本藥品應儲存於緊密容器、25℃ 以下避光處所。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19