
用藥指導單張

衛教小組 DC11090201

學　名：Neostigmine

商品名：NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG 1ML

中文名：甲硫酸新斯狄格明注射液



一、此藥品的用途是什麼？

消化液分泌機能減退、排尿困難、腸管麻痺、因肌無力、肌肉麻痺、神經痛、肌肉萎縮等所引起之各種運動障礙、綠內障、眼部肌無力及瞳孔反應檢查。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 皮下及肌肉注射之，每日1~3 次，每次0.25~0.5mg。
2. 必要時(Antidote to curare Principle) 以 0.5mg之本劑與0.6mg 之Atropine Sulfate 合併而靜脈注射之。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫避光貯存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.18