

用藥指導單張

衛教小組 DB5550301

學名：Fenoterol

商品名：BEROTEC N 100MCG/PUFF 200DOSE

中文名：備勞喘定量噴霧液



一、此藥品的用途是什麼？

下列支氣管痙攣疾患之預防和治療：支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴有支氣管痙攣之肺支氣管障礙。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

維持劑量每日2-4次，每次1-2吸（puff），1天最大劑量8吸。急性發作時：對大多數的患者，一個定量即可緩解症狀，若吸入5分鐘後呼吸沒有明顯的改善，可投與第二個劑量。投與第二個劑量後，若治療仍未改善，可能需要再投與數個劑量，此時應立即請教醫師或就近送醫。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 當有下列疾病患者，需經醫師謹慎評估使用：糖尿病、肝功能不全、腎功能不全。
2. 支氣管阻塞情況惡化或不見改善，不應自行增加 β 2-agonist劑量，需重新評估。
3. 使用 β 2-agonist可能發生嚴重低血鉀，與黃嘌呤(xanthine)衍生物、類固醇、利尿劑合併使用時更有可能發生。此外，對心律不整患者，缺氧可能使低血鉀更嚴重，這類患者應監測血鉀濃度。
4. 規則的使用短效性 β 2-agonist，可能會降低藥物對疾病的控制效果。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

骨骼肌輕微震顫及精神緊張、頭痛、暈眩、心跳過速及心悸。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DB5550301

學 名：Fenoterol

商品名：BEROTEC N 100MCG/PUFF 200DOSE

中文名：備勞喘定量噴霧液

使用。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師