


用藥指導單張

衛教小組 DK9770101

學名：Ciclosporin

商品名：IKERVIS EYE DROPS EMULSION 1MG/1ML (健保事審)

中文名：宜可利眼用乳劑



一、此藥品的用途是什麼？

治療嚴重乾性眼角結膜炎併角結膜上皮病變患者

治療嚴重乾性眼角結膜炎 (Schirmer test without anesthesia < 5mm/5min) 併角結膜上皮病變患者之發炎反應，但在目前使用局部抗發炎藥物或使用淚點塞病患未見療效者。

治療嚴重春季型角膜結膜炎 (VKC)

治療4歲以上兒童至18歲青少年之嚴重春季型角膜結膜炎 (VKC)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

治療嚴重乾性眼角結膜炎併角結膜上皮病變患者使用劑量

成人：建議劑量為IKERVIS一滴，每日一次，就寢時使用於患眼。應至少每6個月再評估一次治療反應。

若忘記某次劑量，應依據平常方式於隔日繼續治療。應告知患者勿於患眼使用超過一滴眼用乳劑。

治療嚴重春季型角膜結膜炎 (VKC)

使用劑量建議在春季型角膜結膜炎 (VKC) 發生季節期間，一天四次 (早上、中午、下午與晚上) 使用於患眼、每次點一滴IKERVIS。如果季節結束後，仍持續發生VKC徵兆與症狀，可依建議劑量持續治療，或者當徵兆與症狀已獲得適當控制，降低劑量至每天兩次、一次一滴。徵兆與症狀消退後應中止治療，復發時再開使用藥。

給藥方式

眼部使用。

給藥前的注意事項

1. 在給藥前，應輕微搖動單一劑量包裝。
2. 僅供單次使用。每支單一劑量包裝足夠用於治療雙側眼部，應立即丟棄任何未用完的眼用乳劑。
3. 應指示患者在使用眼用乳劑後壓住鼻淚管，並闔上眼瞼2分鐘以減少全身性吸收。如此可減少全身性不良反應，及增加局部活性。
4. 若使用超過一種局部眼用藥物，則給藥時間必須間隔至少15分鐘。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DK9770101

學名：Ciclosporin

商品名：IKERVIS EYE DROPS EMULSION 1MG/1ML (健保事審)

中文名：宜可利眼用乳劑



三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

最常見不良反應為眼部疼痛、眼部刺激、流淚、眼部充血與眼瞼紅斑，通常為暫時性發生於治療期間。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫保存($\leq 30^{\circ}\text{C}$)，避免光照。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師