用藥指導單張

衛教小組 DE4190101

學　名：Pyridoxine (vit B6)

商品名：BEESIX 50MG (vit B6)

中文名：維六素錠



一、此藥品的用途是什麼？

妊娠引起之噁心、嘔吐、皮膚炎、維他命B6缺乏症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一般成人劑量：

Pyridoxine依賴症：

初劑量-口服，每日30至600mg。維持劑量-口服，每日50mg，終身服用。

膳食補充：

口服，每日10至20mg，為時3週，繼之每日2～5mg為時數週。

【注意】因服用避孕藥導致不良影響之婦女，建議每日補充劑量為10-25mg。

藥物誘生性Pyridoxine缺乏症：

預防：每日10~50 mg (對penicillamine) 或每日100~300 mg (對cycloserine、hydralazine或isoniazide)。

治療：每日50~200 mg，為時3週，隨後視需要每日25~100 mg。

酒精中毒：每日50 mg，為時2~4週，視需要予無限期延續。

遺傳性鐵質過多貧血：每日200~600 mg，為時1~2個月。若有效繼之以每日30~50 mg，終身服用。

一般兒童劑量：

Pyridoxine依賴症：

嬰兒：維持劑量每日2~10 mg，終身服用。

孩童：見一般成人劑量。

膳食補充：

兒童：每日2.5~10 mg，維持3週，繼之每日2~5 mg (於多種維他命製劑)為時數週。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.本藥不宜與levodopa併用，因每日口服本藥5 mg就會使levodopa的antiparkinsonism作用產生逆轉，但如將carbidopa與levodopa併合

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03

用藥指導單張

衛教小組 DE4190101

學　名：Pyridoxine (vit B6)

商品名：BEESIX 50MG (vit B6)

中文名：維六素錠



使用，則不致於發生。

2. 胎兒暴露於大量pyridoxine的子宮內會導致pyridoxine依賴症。

3. 本藥投用於攝取每日正常需要量之哺乳婦之安全性尚未建立。

4. 忘記服用不必擔心，因本藥之耗竭需時很長，儘量記住遵照指示時間服用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

A 級：　對懷孕第一期（前三個月）之孕婦的對照研究試驗中，顯示該藥物對胎兒無害，且無証據顯示對懷孕後三期產生險性。

五、此藥會造成什麼副作用？

六、此藥儲存時的條件為何？

貯於15~30℃乾燥處所。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03