用藥指導單張

衛教小組 DN9080401

學　名：Snake venom antiserum

商品名：抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清凍晶注射劑

中文名：

一、此藥品的用途是什麼？

對龜殼花及赤尾鮐毒蛇咬傷有特異性之治療效果。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

稀釋方法:

取稀釋液10毫升(mL)溶解一劑量(含1,000 田中單位以上),本品應完全溶解後於二小時內用完。

注射時間:

抗蛇毒血清不能中和已與組織細胞結合之毒素,故毒蛇咬傷後注射本血清愈早,收效愈佳。

注射部位:

咬傷時間不超過二小時,且無全身症狀者,可將一半血清注射於咬傷部周圍皮下,一半作肌肉注射。咬傷時間超過二小時,或已出現全身症狀者,應將小部份血清注射於咬傷部周圍皮下,大部份作靜脈注射。靜脈注射時,第1毫升須經數分鐘時間注完,以後注射速度,每分鐘不得超過1毫升,同時密切注意患者反應,以防萬一。

注射劑量:成人用量普通為一劑量,十歲以下小兒用量加倍。如注射後局部或全身症狀仍繼續增惡,則應每隔半小時至二小時再注射一劑量至全身症狀改善。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本品應完全溶解後於2小時內用完。
2. 被咬傷後4小時注射抗蛇毒血清最有效，超過8小時者效果較差，大量注射時應特別留意血清病的發生。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 血清休克:對血清過敏之人,縱以微量血清,從任何徑路注射,有時於數分鐘至一小時發生嚴重之血清休克,症狀如蕁麻疹、腹痛、腰痛,嚴重時呼吸困難,發紺、血壓下降、虛脫致死。
2. 惡寒發熱:此反應萬一發生,多見於靜脈注射後 20分至一小時,可行對症療法。
3. 血清病:患者起蕁麻疹、發熱、淋巴腺腫脹、關節痛等症狀,以注射

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.10.22

用藥指導單張

衛教小組 DN9080401

學　名：Snake venom antiserum

商品名：抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清凍晶注射劑

中文名：

後4~ 10 日最常見,亦有延至一個月而發生者,此時腎上腺素可收效,但作用短暫。

4.Arthus反應:注射後7日至3個月,再注射同種動物血清時,局部可起反應,進行至組織壞死,本反應須與膿瘍鑑別。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 2 ~ 8 度冰箱內(勿冷凍)；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.10.22