用藥指導單張

衛教小組 DM0230101

學　名：Eltrombopag

商品名：REVOLADE FILM-COATED 25MG(健保事審)

中文名：返利凝膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

用於治療在脾臟切除後且對於其他治療(例如:類固醇、免疫球蛋白等)失敗之成年慢性自發性(免疫性)血小板缺乏紫斑症(ITP)患者，或對於不適合進行脾臟切除之成年慢性自發性(免疫性)血小板缺乏紫斑症(ITP)患者之第二線治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人： Eltrombopag的建議起始劑量為每日一次25 mg。監測與劑量調整：在開始使用Eltrombopag後，請視需要調整劑量，使血小板計數維持在≥ 50,000/μl，以減低出血風險。每日劑量請勿超過50 mg。

在接受Eltrombopag的期間內，應定期監測臨床血液學與肝功能檢查，並依血小板計數(如表1所示)調整Eltrombopag的給藥療程。在Eltrombopag治療的期間內，應每週評估全血球計數(CBC)，包括血小板計數與周圍血液抹片，直到達到穩定的血小板計數(≥ 50,000/μl 至少4週)為止。之後應每個月應蒐集CBC資料，包括血小板計數與周圍血液抹片。

使用方法：該錠劑應被口服給予。Eltrombopag應在服用任何含有多價陽離子的物品至少4小時之前或之後服用，例如：制酸劑、乳製品(或其他含有鈣離子的食物)或含有多價陽離子的礦物質補充劑(例如：鐵、鈣、鎂、鋁、硒、鋅)

三、使用時我該注意的特別事項？

在開始使用Eltrombopag之前和劑量調整期間每2週一次，以及劑量穩定後每月一次，需測量血清ALT、AST、膽紅素濃度。若為評估異常的血清肝臟檢驗，需在3至5天內重複進行檢驗。如果確認出現異常，持續監測血清肝臟檢驗，直到異常緩解、穩定或回復到基礎值(baseline level)為止。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

失眠、頭痛、感覺異常。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.21

用藥指導單張

衛教小組 DM0230101

學　名：Eltrombopag

商品名：REVOLADE FILM-COATED 25MG(健保事審)

中文名：返利凝膜衣錠



六、此藥儲存時的條件為何？

存放於30°C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.21