用藥指導單張

衛教小組 DK5700101

學　名：Benzydamine

商品名：diffLAM（消炎噴液劑）SPRAY 15ML(自費)

中文名：得伏寧加強消炎噴液劑



一、此藥品的用途是什麼？

舒解口腔及咽喉疼痛，包括下列疾病或症狀引起的疼痛：扁桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口腔與牙周手術後疼痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人或年齡大於12歲的小孩：直接噴液2-4次(1-2mg)於疼痛紅腫部位後緩慢吞服。如有必要每1.5-3小時可重複使用。

年齡6-12歲的小孩：直接噴液2次(1mg)於疼痛紅腫部位後緩慢吞服。如有必要每1.5-3小時可重複使用。

6歲以下小孩：不建議使用。

除非在醫師指示之下，連續使用不應超過7天。

清潔說明：使用後，用乾淨的面紙擦乾噴嘴以避免阻塞。

三、使用時我該注意的特別事項？

若咽喉疼痛為細菌感染或病發感染，在使用本品外，應考慮其他抗菌藥劑的治療。肝臟或腎臟功能不全之患者應小心使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

一般最常通報的不良反應是口腔的麻木感。

六、此藥儲存時的條件為何？

應避開光線。
儲存於25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02

用藥指導單張

衛教小組 DK5700101

學　名：Benzydamine

商品名：diffLAM（消炎噴液劑）SPRAY 15ML(自費)

中文名：得伏寧加強消炎噴液劑



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02