用藥指導單張

衛教小組 DR6560101

學　名：Parecoxib

商品名：DYNASTAT 40MG(自費)

中文名：得術泰注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

短期(不宜超過四天)使用於外科手術後疼痛之緩解。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
建議劑量為40mg，靜脈注射或肌肉注射，接著視需要每12至24小時可再給予20mg。如採靜脈注射，可直接迅速地注入靜脈或注入既有的靜脈注射管線中。如採肌肉注射，則需將注射液緩慢地注入肌肉深部。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 當parecoxib sodium與acetylsalicylic acid (即使是低劑量)併用時，發生胃腸道不良反應(胃腸潰瘍或其他胃腸道併發症)的風險更高。
2. 一出現皮疹、黏膜病灶或其他過敏徵象，就該立即停止使用parecoxib。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

感覺遲鈍、搔癢、高血壓、消化不良、脹氣、周邊水腫。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 調配前，儲存無特別注意事項。
2. 調配完成之Dynastat注射液不可冷藏或冷凍。
3. 調配完成之Dynastat注射液應於24小時內使用，否則應予以丟棄。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09